

**Департамент агропромислового розвитку
Чернігівської обласної державної адміністрації
Секція науково-інноваційного розвитку АПК Чернігівської області
Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового
виробництва НААН**

**РЕКОМЕНДАЦІЇ
З ПРОВЕДЕННЯ ВЕСНЯНО-ПОЛЬОВИХ РОБІТ В УМОВАХ 2025 РОКУ
В ГОСПОДАРСТВАХ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

ЧЕРНІГІВ 2025

УДК 633.1:631.3;631.5;631.8

Матеріали підготували:

Від Департаменту агропромислового розвитку Чернігівської
облдержадміністрації

Крапивний О.В., Жук В.О.

Від Інституту сільськогосподарської мікробіології та агропромислового
виробництва НААН

Москаленко А.М., Бардаков В.А., Халеп Ю.М., Єгоров О.В.,
Волкогон В.В.,

Від Чернігівської філії Українського інституту експертизи сортів рослин
Ткалич Ю.В.

Від Чернігівського обласного центру з гідрометеорології
Овсєєнко Р.Р.

Схвалено рішенням Вченої ради Інституту сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН протокол № 3 від 12 березня 2025 року.

Розглянуто особливості догляду за посівами озимих культур, підготовки та проведення сівби ярих культур в умовах 2025 р. Охарактеризовано стан посівів озимих культур та заходи догляду за ними, шляхи оптимізації обробітку ґрунту, підготовки насіння до сівби, удобрення, підбору сортів, строків сівби, норм висіву і способів сівби та захисту посівів ярих культур від хвороб і шкідників з метою підвищення врожайності культур. Наведено коротку характеристику мікробних препаратів та застосування їх у технологіях вирощування сільськогосподарських культур. Для агрономів, керівників і спеціалістів сільського господарства, підприємців, фермерів, наукових працівників, викладачів, студентів та аспірантів аграрних навчальних закладів.

Рекомендації з проведення весняно-польових робіт в умовах 2025 року в господарствах Чернігівської області. Чернігів, 2025. 48 с.

ЗМІСТ

ВСТУП	4
ОСОБЛИВОСТІ ДОГЛЯДУ ЗА ПОСІВАМИ ОЗИМИХ КОЛОСОВИХ ТА ОЗИМОГО РІПАКУ В РАННЬОВЕСНЯНИЙ ПЕРІОД	7
СИСТЕМА ЗАХИСТУ ПОСІВІВ ОЗИМИХ КУЛЬТУР	14
ПРОГНОЗОВАНІ ОБСЯГИ ТА ОСНОВНІ НАПРЯМИ ПРОВЕДЕННЯ ВЕСНЯНО-ПОЛЬОВИХ РОБІТ	17
ОСОБЛИВОСТІ АГРОТЕХНІКИ ЯРИХ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР	20
Зернобобові культури	32
Кукурудза	36
Ріпак ярий	38
Гречка	39
Просо	41
Картопля	43
ЗАСТОСУВАННЯ МІКРОБНИХ ПРЕПАРАТІВ У ТЕХНОЛОГІЯХ ВИРОЩУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР	46

ВСТУП

Результативність роботи аграрної сфери в значній мірі залежить від стратегії весняного поля, яка закладає основи майбутнього урожаю. В цьому питанні важливо досягти балансу екологічних та економічних інтересів на основі оптимізації структури посівних площ, засобів інтенсифікації виробництва та посилення природних функцій землеробства.

На Чернігівщині площі посіву озимих культур під урожай 2025 року за даними Департаменту агропромислового розвитку Чернігівської обласної державної адміністрації становлять 260 тис. га (198,8 тис. га зернових та 61,2 тис. га ріпаку), що майже на 10 % більше за минулорічні показники.

Значний вплив на формування вегетативних та генеративних органів культурних рослин, продуктивність та кінцевий розмір їх врожаю, якість продукції, а отже і її вартість мають погодні умови, що складаються протягом вегетації вирощуваних культур.

В господарствах Чернігівської області посівна кампанія озимих культур 2024 року значно розтягнулася в часі, розпочалася в третій декаді серпня посівом озимого ріпаку та тривала майже до кінці жовтня. Так, станом на 4 жовтня 2024 року в регіоні було посіяно лише 120,2 тис. га (60% до прогнозу) озимих сільськогосподарських культур під урожай 2025 року. Озимого ріпаку було посіяно на площі 61,2 тис. га (100% до прогнозу). Зазначене було обумовлене несприятливими погодними умови, особливо гострою проблемою стала нестача вологи, що негативно вплинуло на схожість насіння та розвиток молодих рослин.

Як результат, озимі культури під час припинення вегетації 10 листопада, що на 5-8 днів, до речі, пізніше звичайного, перебували у різних фазах розвитку: сходів, двох-трьох справжніх листків та початку куціння. Озимий ріпак також припинив вегетацію 10 листопада. На цей час його посіви знаходились у фазі сходів та 1-го справжнього листка.

З початку холодів погодні умови в регіоні для перезимівлі озимих у цілому склалися задовільно. За даними Чернігівського обласного центру з гідрометеорології протягом листопада переважала тепла погода з опадами різної інтенсивності. 3 листопада відбувся перехід середньодобових температур повітря через $+5^{\circ}$, на 4-11 днів пізніше звичайного. Середньомісячна температура повітря склала $1,6-2,5^{\circ}\text{C}$ тепла, на $0,4-0,8^{\circ}\text{C}$ вище за середні багаторічні значення. Максимальна температура повітря підвищувалась до $11-13^{\circ}\text{C}$ тепла. Мінімальна температура повітря знижувалась до $6-8^{\circ}\text{C}$, на поверхні снігу до $7-11^{\circ}\text{C}$ морозу. Періоди холодної погоди зареєстровані 5 та 24-27 листопада. У ці дні середньодобові температури повітря були нижчими за середні багаторічні значення на $1-4^{\circ}\text{C}$. У решту днів температури були вище за норму на $1-6^{\circ}\text{C}$ або близькою до неї. Глибина промерзання ґрунту станом на 30 листопада місцями у південно-західних та південно-східних районах становила 1-8 см, на решті території ґрунт був талий. На більшій частині території області сніговий покрив утворився 21 листопада середньою висотою 1-6 см і залягав тут до кінця місяця суцільним рівномірним шаром середньою висотою 1-10 см. Кількість опадів за місяць дорівнювала 40-76 мм (94-133% від норми). *Загальний стан посівів озимих культур в області після припинення вегетації був добрий. Мінімальна температура ґрунту на глибині залягання вузла кушіння озимих у південній половині області знижувалась до $0-2^{\circ}\text{C}$ морозу, у північній половині – до 0°C тепла і не була загрозливою для перезимівлі озимих культур.*

У грудні також переважала тепла та дуже тепла погода з частими опадами різної інтенсивності. Середньомісячна температура повітря у грудні склала від $0,0^{\circ}\text{C}$ тепла до $1,0^{\circ}\text{C}$ морозу і була вище за середні багаторічні значення на $2,2-2,6^{\circ}\text{C}$. Максимальна температура повітря підвищувалась до $4-7^{\circ}\text{C}$ тепла. Мінімальна температура повітря знижувалась до $7-10^{\circ}\text{C}$, на поверхні снігу до $9-13^{\circ}\text{C}$ морозу. Похолодання відмічалось 4-5 та 13-14 грудня, коли середньодобові температури повітря виявилися на $1-2^{\circ}\text{C}$ нижче за середні багаторічні значення

або близькими до них. Мінімальна температура ґрунту на глибині залягання вузла кущіння озимих на початку грудня знижувалась до 0-4°C морозу і місцями була загрозливою для перезимівлі слаборозвинених з осені рослин озимого ріпаку. Сніговий покрив протягом місяця на більшій частині території області зберігався до 16 грудня середньою висотою 2-7 см. На кінець грудня він залягав лише у східних районах суцільним рівномірним шаром середньою висотою 2 см. Станом на 31 грудня ґрунт був талий, у північно-східних та східних районах глибина промерзання ґрунту склала 3-4 см, зверху ґрунт відтанув на 1 см. Кількість опадів за місяць дорівнювала 23-41 мм (53-89% від норми). **Таким чином, на кінець 2024 року озимі культури перебували у стані неглибокого зимового спокою, тепла погода також негативно вплинула на їх зимостійкість.**

У січні та на початку лютого переважала погода з підвищеним температурним режимом та опадами різної інтенсивності. Середньодобові температури повітря протягом січня виявилися на 1-13°C вище за середні багаторічні показники. Середньомісячна температура повітря у січні склала 1-2°C тепла, що на 6°C вище за середні багаторічні значення. Сніговий покрив відмічався місцями з 1 по 9 січня та 17 січня, на всій території області – з 11 по 16 січня середньою висотою від <0,5 до 4 см. Станом на 31 січня сніговий покрив був відсутній. Глибина промерзання ґрунту станом на 31 січня була від <0,5 до 2 см. У східних районах Чернігівської області ґрунт був талий. Мінімальна температура повітря знижувалась до 6-8°C морозу, поверхня снігу охолоджувалась до 5-9°C морозу. За весь період спостережень таким теплим січень був вперше. У цілому за місяць опадів випало 15-29 мм (41-67% від норми). **Озимі культури перебували у стані неглибокого зимового спокою. У третій декаді січня на посівах озимих культур відмічалось тимчасове відновлення вегетації, місцями у південно-східних районах зі змінами у розвитку. Мінімальна температура ґрунту на глибині залягання вузла кущіння озимих знижувалась до 1-4° морозу і могла загрожувати перезимівлі слаборозвинених з осені рослин озимого ріпаку.**

ОСОБЛИВОСТІ ДОГЛЯДУ ЗА ПОСІВАМИ ОЗИМИХ КОЛОСОВИХ ТА ОЗИМОГО РІПАКУ В РАННЬОВЕСНЯНИЙ ПЕРІОД

Ранньовесняна оцінка стану посівів озимих зернових культур вимагає особливо ретельного і своєчасного її проведення: перед відновленням весняної вегетації, в процесі настання весняної вегетації і остаточно – через 10-12 днів після відновлення вегетації.

Відновлення весняної вегетації залежить від перебігу середньодобової температури повітря – з настанням температури вище 5°C і нарощуванням її, пшениця починає вегетацію вже на 4-5 день, а при різких перепадах температури в сторону зниження протікання вегетації може бути малоактивним і непомітним для оцінки.

Перед відновленням вегетації озимих зернових культур проводять:

1. оцінку стану посівів за рівномірністю густоти;
2. оцінку стану тканин вузла кущіння;
3. біологічний контроль конусу росту.

Після відновлення весняної вегетації оцінюють:

1. стан виходу рослин із зими (густота, фаза; рослини, що загинули);
2. регенерацію листкового апарату;
3. наявність і відростання вторинних коренів весняного утворення;
4. заселення площ гризунами;
5. засмічення бур'янами;
6. ураження листкового апарату хворобами;
7. погодні умови і необхідність ремонту або пересіву перевірених площ;
8. необхідність і норми підживлення азотними добривами.

Враховуючи, що значна частина посівів озимих культур пішла в зиму у фазі сходів і початку кущіння, то в догляді за посівами необхідно враховувати особливість настання весни. Слід бути готовим до різних варіантів весняного

періоду і відповідно діяти щодо підходів підсіву, пересіву, характеру удобрення і захисту рослин від бур'янів і хвороб.

Слід передбачити можливі подальші дії як мінімум за трьома варіантами.

- *Рання, затяжна, волога і прохолодна весна (оптимістичний варіант).*

Такий хід весни створює надзвичайно сприятливі умови для весняного кущіння озимих культур, що може повністю знівелювати недостатнє осіннє кущіння. До виходу в трубку рослини таких агроценозів формують потужну листову поверхню і добру врожайність. При цьому виправдано підживлення рослин по мерзлоталому ґрунті, що стимулюватиме весняне кущіння і ріст листків. Подальші позакореневі підживлення посівів (карбамід, КАС) стабілізують ріст і розвиток рослин.

- *Прихід весни за звичайними середньобагаторічними календарними строками.* Створюються добрі умови для розкущених з осені рослин озимих культур і тих, які знаходяться на початку кущіння. Ріст і розвиток рослин, що знаходяться у фазі сходів значно затримуватиметься, а тому такі посіви не зможуть сформувати потужний продуктивний стеблостій. У такій ситуації економічний ефект забезпечить правильне підживлення, захист рослин і підсів слабких і зріджених посівів, які вийшли із зими у фазі сходів.

- *Швидкий перехід від зими до літа (запізнення з приходом весни, (найбільш несприятливий варіант).* Може бути повністю відсутнє весняне кущіння озимих культур. Швидке наростання плюсових температур негативно впливатиме на формування і ріст кореневої системи, листового апарату і формування врожайності. У такій ситуації необхідно бути готовим до можливих значних пересівів і підсівів, ефективної боротьби з бур'янами, раціонального удобрення.

Тому слід визначити стан озимини на період відновлення вегетації в умовах, що складаються, необхідно встановити подальший постійний моніторинг за життєздатністю рослин.

За умови, коли на 1 м² залишилось менше 150 розкущених, або 200-250 нерозкущених рослин, такі площі доцільно пересіяти. Ремонту підлягають посіви з

густотою 150-200 розкущених рослин, або 250-300 нерозкущених, а також площі, де рослини на період відновлення весняної вегетації знаходяться у фазі сходів і мають менше 350 шт./м². Виробничий та науковий досвід показує, що краще за такої ситуації на 10% збільшити площу підсіву відразу, ніж на цю величину залишити її без ущільнення, в якому з часом може з'явитися потреба, але будуть втрачені оптимальні строки. Зазвичай пересів проводять ранньостиглими сортами пшениці ярої, ячменю. У випадках, коли оптимальні строки сівби для ранніх ярих культур минули, пересів озимих можна провести просом, соєю, гречкою, кукурудзою.

Враховуючи невітшний стан озимих зернових культур під час входу в зиму, спеціалісти господарств повинні особливу увагу приділити догляду за посівами цих культур у весняний період. Для стимулювання швидкого відростання і формування повноцінної кількості продуктивних стебел, озимі зернові культури необхідно підживити азотними добривами. При визначенні дози азоту у весняне підживлення враховують стан розвитку озимини після перезимівлі і запаси нітратного азоту у весняний період на основі результатів агробіологічного контролю, а також час відновлення весняної вегетації озимих культур.

У першу чергу необхідно підживити зріджені та недостатньо розвинуті посіви, а потім решту. Для стимулювання весняного кущіння і розвитку кореневої системи на зріджених, слаборозвинених та пошкоджених сніговою пліснявою посівах доза азоту у підживлення перед відновленням вегетації повинна становити орієнтовно 50-60 кг/га (за умови, якщо цю дозу не внесено перед входом в зиму), а на добре розвинених посівах доза азоту може становити 20-30 кг/га.

У лісостеповій зоні області на посівах, які розміщені після зайнятих парів та зернобобових попередників і добре перезимували, підживлення рослин по мерзлоталому ґрунті у ранньовесняний період проводити не рекомендується і його слід перенести на III етап органогенезу (через 8-10 днів після відновлення весняної вегетації), коли призупиняються процеси весняного кущіння і внесений

азот використовується для підтримання потенціалу колосу, а не витрачається на додаткові пагони.

Основну дозу азоту у підживлення слід використати на початку виходу рослин в трубку (IV етап органогенезу). Внесення азоту в цей період розвитку рослин сприяє кращому виживанню продуктивного стеблостою, більшої кількості закладання колосків у колосі, підвищенню посухостійкості рослин пшениці озимої. Дози азоту при цьому корегуються з урахуванням попередньо внесених. Так, якщо при відновленні вегетації було внесено 50-60 кг/га діючої речовини азоту, то на IV етапі потрібно довести 40-50 кг/га, а при внесенні 20-30 кг/га в перший період – 60-70 кг/га. Третє підживлення азотом на VII-VIII етапах органогенезу рослин, дозою 20-30 кг/га, ефективно при вирощуванні сильних по якості пшениць і дозволяє підвищити масу 1000 зерен і забезпечити формування високоякісного зерна пшениці I-III класу, але за умови боротьби з комплексом шкідників пшениці озимої, таких як хлібні жуки, трипси і, особливо, клоп шкідлива черепашка.

Озимий ріпак. У господарствах області озимий ріпак посіяно на площі **61,2 тис. га**. Для нормальної перезимівлі ріпаку озимого рослини з осені повинні пройти період загартування. За температури 5-7°C цей процес проходить 14-20 днів. За цей час у листках нагромаджуються високоенергетичні речовини (цукор, пентозан, амінокислоти) з низькою точкою замерзання. Пізніше ці речовини переходять в кореневу шийку та точку росту. Внаслідок відтікання вільної води з клітин у рослинах підвищується стійкість до низьких температур. За оптимальних умов період осіннього росту повинен тривати 50-60 днів, після якого рослини входять у зиму з добре розвиненою листковою розеткою і кореневою системою 100-150 см (довжина головного стрижня кореня 15-20 см), що є основою успішної перезимівлі.

Однозначно найкраще перезимовують рослини які сформували розетку 6-8 справжніх листків, діаметром кореневої шийки не менш ніж 8 мм і довжиною

стебла від 8 до 10 см і мають висоту розташування точки росту 2-3 см (не більше). Такі рослини ріпаку озимого можуть витримувати температури до -21-22°C.

Рослини ріпаку озимого, що сформували розетку з 6 листків, витримують температури на рівні кореневої шийки до -16-17°C.

Ріпак озимий, рослини якого мають недорозвинену розетку з 4-5 листків, кореневу систему, яка сягає менш ніж 90 см (головний стрижень 7-9 см) може загинути за температури повітря -8-12 °C.

Найбільш уразлива до низьких температур коренева шийка. Причинами вимерзання можуть бути різке та раптове зниження температури а також переростання ріпаку з осені, а навесні найчастіше під час раптового повернення холодів. При переростанні, коли ґрунт не мерзлий і рослини покриті сніговим покривом виникатиме загроза випадання посівів ріпаку. Причиною цього є велика витрата накопичених поживних речовин на дихання та ростові процеси. Якщо цей процес буде тривати більше 50 днів, як правило, окрім випадання рослини будуть сильно вражені хворобами (пліснява, фомоз, інше). Такі посіви не в змозі забезпечити високий рівень урожайності та потребуватимуть спеціального догляду (мікроелементи, рістстимулюючі добрива).

Густота стояння рослин істотно впливає на винесення рослинами точки росту, розвитку кореневої системи в осінній період, що має пряме відношення до зимостійкості та продуктивності рослин. Чим більша густота, тим гірша зимостійкість і нижча продуктивність.

Густота рослин перед входом в зиму повинна складати для сортів ріпаку 60-80 шт/м², для гібридів – 50-60 шт/м².

При переростанні і при загущених посівах доцільним було з осені використовувати регулятори росту із фунгіцидною дією.

У період відновлення весняної вегетації необхідно проводити подальший постійний моніторинг життєздатності та густоти стеблостою рослин. Рішення про

подальший догляд, або пересівання ріпаку можна приймати, враховуючи густоту, яка визначається за наступними параметрами:

- за густоти стояння рослин більше 40 шт/м² посіви вважаються добрими;
- за рівномірного розподілу і наявності на 1 м² 30-40 рослин – задовільними;
- за наявності менше 20 рослин на 1 м² посіви необхідно пересіяти ріпаком ярим, або іншими культурами (з урахуванням внесених мінеральних добрив і гербіцидів).

При пересіві необхідно враховувати і таку особливість ріпаку озимого, як здатність його за рахунок сильного розгалуження вирівняти недоліки в щільності стеблостою. Якщо конус не зруйновано, то проростання відбувається з добре розвиненої кореневої шийки. При зруйнованому конусі наростання можуть прорости додаткові бруньки і утворитися вторинні стебла. Враховуючи, що утворення вторинних стебел відбувається повільніше ніж регенерація непорушеного головного стебла, рішення про пересів ріпаку озимого слід приймати тільки за результатами детального моніторингу стану посіву після початку вегетації.

Утворення бруньок та підвищення продуктивності ріпаку необхідно простимулювати внесенням азотних добрив у дозі 30-50 кг/га діючої речовини при відновленні вегетації, близько 60 кг/га д.р. – при стеблунанні культури та 30 кг/га – на початку бутонізації.

При виході із зими обов'язкове підживлення азотними добривами. В холодну і затяжну весну підживлення проводять двічі по 50-60 кг/га д.р. азоту.

Якщо посіви слаборозвинені, то їх слід обробляти стимуляторами росту, мікробними препаратами та мікроелементами.

Внесення мікроелементів можна проводити у комплексі з іншими заходами по догляду за рослинами, якщо їх терміни співпадають (боротьба зі шкідниками, хворобами і ін.).

Пізнім посівам ріпаку озимого необхідно приділити особливу увагу, адже для слабких, недостатньо розвинених рослин весняний період може бути критичним. Недостатньо розвинена коренева система не в змозі компенсувати втрати рослиною вологи за чергування плюсових (денних) та мінусових (нічних) температур. Слабкі посіви, вдало перезимувавши під снігом, інколи не можуть витримати такої зміни температурного режиму і гинуть.

Недостатнє внесення азоту можна доповнити дворазовим позакореневим підживленням 5-10% розчином карбаміду (15-30 кг на 300 л води) або КАС, при цьому необхідно строго дотримувати концентрацію розчину і не проводити оброблення у фазу цвітіння ріпаку. Підживлення магнієм можна проводити 2 рази у вигляді 2-4% розчину сірчанокислового магнію. Таким же способом можна застосовувати всі рідкі комплексні добрива, що містять азот, магній і сірку, а також мікроелементи.

Розчини сечовини і рідкі комплексні добрива слід застосовувати спільно із засобами захисту рослин, коли терміни боротьби проти більшості шкідників і позакореневого підживлення співпадають.

СИСТЕМА ЗАХИСТУ ПОСІВІВ ОЗИМИХ КУЛЬТУР

Суттєві зміни кліматичних умов і природні еволюційні процеси в популяціях збудників хвороб сприяють генетичній і трофічній різноманітності останніх. Все це посилює шкодочинність як поширених хвороб, так і тих, які раніше не мали практичного значення.

Ураженість хворобами озимих зернових культур під час відновлення вегетації у значній мірі залежить від запасів вологи в ґрунті. Погодні умови зимового періоду 2025 року: різке коливання температур, незначна кількість опадів у вигляді снігу та дощу, аномально високі температури створюють сприятливі умови для розвитку та поширення таких хвороб, як борошниста роса, септоріоз, кореневі гнилі, гельмінтоспоріоз, фузаріоз.

Враховуючи вищезазначене, слід бути готовими до своєчасного та ефективного захисту посівів. При цьому переважати має превентивне (упереджувальне) застосування фунгіцидів, що забезпечують ефективність за понижених добових температур. Асортимент препаратів при цьому має відповідати родовим та видовим особливостям патогенів, які однак, мають бути уточнені в конкретних умовах весни, поля, попередника тощо.

При застосуванні фунгіцидів важливо не пропускати строки їх внесення та критичну фазу розвитку хвороби, оскільки при цьому використання навіть найсучасніших препаратів буде мало корисним.

Вибір препаратів слід проводити відповідно спектру їхньої фунгіцидної дії. Проти борошнистої роси доцільно застосовувати Фундазол (Бенлат), Дерозал, Байлетон, Топсін М, Флексіті; проти бурої листової іржі та септоріозу – Байлетон, Імпакт К, Рекс Дуо, Фолікур БТ, Альто Супер, Амістар Екстра, Абакус; проти церкоспорельозу – Рекс Дуо, Міраж, Імпакт К, Фундазол.

За співпадіння термінів оброблення посівів проти хвороб, шкідників, або бур'янів можна застосовувати бакові суміші. Але слід пам'ятати, що до складу

бакових сумішей не повинно входити більше 4-х діючих речовин препаратів, включаючи добрива.

На сьогодні через порушення технології вирощування озимини значно збільшується забур'яненість посівів, і, як наслідок, знижується урожайність. Дослідженнями встановлено, що наявність 10 рослин однорічних бур'янів на 1 м² призводить до зменшення врожаю зерна пшениці озимої на 7-12%, а за наявності 30-40 шт./м² втрати можуть сягати 30-35%. У зв'язку з цим без застосування ефективних заходів контролю бур'янів у посівах культури неможливо отримати високі й якісні показники її врожайності.

Основне забур'янення посівів озимих зернових культур сформувалось у осінній період – до 75% від загальної кількості. Ядро бур'янового ценозу становлять зимуючі і озимі двосім'ядольні види: підмаренник чіпкий, триреберник непахучий, фіалка польова, грицики звичайні, злинка канадська, грабельки звичайні, жовтозілля весняне, талабан польовий, хрінниця смердюча, сокирки польові, кучерявець Софії, волошка синя. Серед них найшкідливішими є триреберник непахучий, грицики звичайні, фіалка польова, які становлять до 60% ценозу. З озимих злакових у посівах переважно присутні метлюг звичайний, тонконіг, зрідка – бромус житній. Рясність бур'янів варіювала залежно від попередників, типу ґрунтів, рельєфу місцевості.

Вибір гербіциду залежить у першу чергу, від видів бур'янів на кожному конкретному полі, але перевагу слід надавати препаратам з відносно широким спектром дії, а також тим, які ефективно працюють за відносно низьких температур повітря (вище + 5°C). Це в першу чергу: Гроділ Макс 375 OD, (0,09 - 0,11 л/га), Гранстар Голд (0,25-0,30 кг/га), Діанат в.р.к. (0,15 - 0,3 л/га, Серто Плюс в.г. (0,15 - 0,20 л/га + ПАР Цитоветт Про - 0,2 л/га), Калібр 75 в.г. (30 - 60 г/га) та інші рекомендовані.

За присутності у посівах озимих зимуючих і ярих злакових бур'янів доцільно провести обробіток посівів баковою сумішшю одного зі згаданих вище препаратів

у поєднанні з Пумою Супер, Аксіалом або іншими ефективно діючими грамініцидами. Основною вимогою є застосування бакової суміші за температури вище + 10°C.

Для боротьби з бур'янами в посівах **озимого ріпаку** доцільним є внесення післясходових гербіцидів. Проти однорічних та багаторічних дводольних бур'янів: Галера (0,3 - 0,35 л/га), Лонтрел Гранд (0,12 - 0,2 л/га) та ін. Проти злакових: Зеллек Супер (0,5-1,0 л/га), Фюзілад Форте (0,5 - 1,0 л/га), Тарга Супер (1 - 3 л/га) та ін.

Ріпак сильно пошкоджується шкідниками. Проти прихованохоботників, хрестоцвітних блішок, ріпакового квіткоїда слід використовувати такі інсектициди: Біскайя (0,25-0,40 л/га), Нурелл Д (0,6 л/га), Фастак (0,1-0,15 л/га) та ін.

Для боротьби з такими хворобами як фомоз, пероноспороз, склеротиніоз, сіра гниль та ін. використовують: Фолікур (0,5 - 1,0 л/га), Амістар Екстра (0,75 - 1,0 л/га), Піктор (0,5 л/га), Карамба (0,75-1,25 л/га) та ін. Поряд з цим внесення Карамби та Карамби турбо навесні сприяє не тільки зниженню ураження посівів хворобами, але й підвищенню стійкості посівів до вилягання, оскільки препарат діє як регулятор росту.

З відновленням вегетації на всіх посівах необхідно провести ретельне обстеження на наявність мишоподібних гризунів.

**ПРОГНОЗОВАНІ ОБСЯГИ ТА ОСНОВНІ НАПРЯМИ ПРОВЕДЕННЯ
ВЕСНЯНО-ПОЛЬОВИХ РОБІТ**

Зважаючи на ситуацію, що склалася в сільському господарстві нашої країни після широкомасштабного вторгнення російської федерації (значне здорожчання паливно-мастильних матеріалів, мінеральних добрив, логістичних витрат) прогнозується зміна структури посівних площ в Україні і в нашому регіоні зокрема.

У 2025 році в Чернігівській області за даними Департаменту агропромислового розвитку (див. табл.1) прогнозується збільшення площ під сою та соняшник порівняно з минулим роком на 7% і 14% відповідно, і зменшення під кукурудзу – 405,0 тис. га (в 2024 році - 423,5 тис. га). Залишається тенденція до зростання посівних площ під цукровим буряком (6,0 тис.га проти 5,2 тис.га в 2024 році).

Таблиця 1. Очікувана структура посівних площ сільськогосподарських культур по всіх категоріях господарств під урожай 2025 року по Чернігівській області (за даними Департаменту агропромислового розвитку Чернігівської обласної державної адміністрації)

Структура	2025 р. прогноз	Структура	2025 р. прогноз
Вся посівна площа	1 291,6	Технічні, всього	457,2
Зернові, всього	680,5	з них: цукрові буряки (фабричні)	6,0
Озимі на зерно	198,8	соняшник	240,5
з них: пшениця та тритикале	186,5	ріпак озимий	61,2
жито	9,6	ріпак ярий	2,0
ячмінь	2,7	соя	139,5
Ярі зернові та зернобобові	481,7	льон олійний	2,0
з них: ячмінь	13,0	інші технічні	6,0
пшениця	12,0	Картопля та овочі, всього	75,2
овес	23,5	з них: Картопля	63,6
Зернобобові – всього	10,0	Овочі, всього	11,6
в тому числі горох	6,0		
гречка	7,0		
просо	11,0		
кукурудза на зерно	405,0		
інші зернові	0,2		

В цілому разом з озимими культурами обсяг посівів сільськогосподарських культур по всіх категоріях господарств під урожай 2025 року по Чернігівській області становитиме близько 1291,6 тис. гектарів. Для порівняння, в 2024 році на Чернігівщині сільськогосподарські культури займали 1261,6 тисяч гектарів.

Період весняно-польових робіт майже завжди характеризується великим обсягом робіт. Максимальне наближення тривалості робіт до оптимальних агротехнічних строків забезпечує диференційований підхід до кожного поля, в першу чергу, застосування такої технології підготовки ґрунту, сівби, догляду за посівами, за якої буде забезпечена необхідна якість і, відповідно, високий результат.

Втілюючи в життя прогнозовані обсяги робіт, аграріям області необхідно активно освоювати інноваційний потенціал як української, так і світової аграрної науки, застосовуючи його у виробничій практиці. Рівень вже досягнутих показників виробництва зерна, технічних культур, картоплі є свідченням того, що поряд із нарощуванням в останні роки обсягів застосування мінеральних добрив, у кожному районі області знаходять виробниче застосування елементи екологічного ведення землеробства. Не так швидко як хотілося б, проте поступово відбувається зміна підходів до ощадливого використання ґрунтової родючості. Тому і надалі динамічно має відбуватися нарощування обсягів площ, на яких проводиться приорювання соломи, стебел та пожнивних решток зернових, олійних культур із застосуванням «пришвидшувачів» мінералізації (не лише аміачної селітри, а й біологічних деструкторів стерні), посів сидеральних культур та використання мікробних препаратів.

Вирощування озимих, на відміну від ярих сільськогосподарських культур, залежить не лише від агрометеорологічних умов періоду їх активної вегетації, а й від умов зимового періоду. Слід враховувати, що здатність рослин протистояти

несприятливим явищам зимового періоду залежить як від зимостійкості культури та сорту, так і від рівня агротехніки в конкретному господарстві або навіть полі.

Зміни клімату досі залишаються спірним питанням. Проте ігнорувати й погоду за вікном, і висновки метеорологів таки не варто. Агromетеорологічна характеристика вегетаційних періодів основних сільськогосподарських культур нашої зони свідчить про значні відхилення температурного режиму від середньобагаторічного показника, вологи стає менше, надходить вона не рівномірно, посухи трапляються все частіше.

Тому науковці Інституту сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН готові до співпраці з конкретними господарствами щодо наукового забезпечення вирощування відповідних сільськогосподарських культур.

Загальні ж напрями проведення весняно-польових робіт в умовах цього року мають передбачати:

- максимально ефективно використання зимово-весняних запасів вологи;
- обов'язкове та вчасне науково обґрунтоване підживлення озимих культур;
- проведення польових робіт у максимально стислі строки та виконання декількох операцій за один прохід;
- забезпечення науково обґрунтованого удобрення ярих культур;
- здійснення повного хімічного захисту посівів проти бур'янів, хвороб та шкідників;
- протруювання насіння ярих культур;
- активне застосування мікробних препаратів та мікроелементів у технологіях вирощування сільськогосподарських культур.

ОСОБЛИВОСТІ АГРОТЕХНІКИ ЯРИХ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР

Обробіток ґрунту. У системах весняного обробітку ґрунту визначальне значення має перебіг погодних умов. Відсутність потужного снігового покриву в зимовий період не дає можливості отримати в ґрунті необхідну кількість вологи. Тому організація весняно-польових робіт має бути проведена у максимально короткі строки, за можливості в одному технологічному циклі з сівбою.

За таких умов застосування широкозахватних знарядь та комбінованих агрегатів, які поєднують операції по розпушуванню, вирівнюванню й ущільненню ґрунту, є ефективним не лише для збереження вологи, дотримання оптимальних строків сівби, але й у плані ресурсозбереження внаслідок економії трудових, енергетичних і матеріально-технічних ресурсів.

Весняний обробіток починають за настання фізичної стиглості ґрунту, ознаками якої є добре кришіння, відсутність прилипання ґрунту до робочих органів знарядь, посвітління гребенів та грудок на полі. На відміну від піщаних і супіщаних ґрунтів суглинкові мають вузький інтервал вологості і часу для якісного виконання весняного обробітку. Разом з тим, проведення обробітку до настання фізичної стиглості викликає переущільнення, а затримка – до висушування насіннєвмісного шару.

Перш за все, постає питання про ранньовесняний обробіток – закриття вологи. Теорія і досвід багатьох господарств свідчать, що намагання зменшити втрати вологи на ґрунтах чорноземного типу за рахунок ранньовесняного боронування здебільшого себе не виправдовує, адже та волога, яка рухається по капілярах, втрачається з ґрунту ще до того, як на поле може зайти техніка. Стосовно безструктурних сірих лісових і дерново-підзолистих ґрунтів, які мають дуже вузький діапазон вологості і часу, коли ґрунт знаходиться у стані фізичної стиглості, то на них за всіх умов бажано розпочинати польові роботи безпосередньо з передпосівного обробітку ґрунту за настання його фізичної стиглості.

Для культур, що будуть сіятися пізніше, слід лише вирівняти площу шляхом боронування. Останнє активно провокує проростання бур'янів.

Зволікання з боронуванням призводить до втрат великої кількості вологи, які можуть сягати 30–60 т з гектара щоденно. На вирівняних полях після стерньових попередників, оброблених з осені важкими дисковими боронами або безполицевими знаряддями, проводити ранньовесняне боронування недоцільно.

Наступний обробіток бажано проводити безпосередньо перед сівбою. Будь-яка ранньовесняна культивуація, особливо глибока, призведе до пересихання верхнього шару ґрунту і блокування проростання в ньому бур'янів. Останні зійдуть зазвичай на початку розвитку культури.

Запізнення з проведенням передпосівної культивації, особливо за посушливої погоди, затримує сівбу ранніх ярих культур і тим самим знижує їх урожайність. Надмірно глибокий обробіток навесні збільшує шпаруватість ґрунту, що посилює його висушування, особливо за жаркої вітряної погоди. Тому глибина передпосівної культивації в усіх випадках повинна відповідати глибині загортання насіння. Порушення цієї вимоги призводить до зависання зерна в напівсухому прошарку ґрунту і зрідженості сходів. Серед знарядь для допосівного обробітку більш досконалішими є культиватори зі стрілочастими лапами на S-подібних пружинних стояках.

У господарствах, де не проведено своєчасного основного обробітку з осені під ярі культури, з початком весняно-польових робіт основна перевага буде за використанням безполицевих знарядь (БДТ-3, БДТ-7, БДВ-3). У господарствах, які мають сучасну техніку для підготовки необробленого з осені ґрунту, слід використовувати агрегати типу АГД, АКШ та «Торит» або «Рубін», чи їх аналоги.

Основне знаряддя *передпосівного обробітку* за сучасних умов – культиватор типу „Європак”, який добре зарекомендував себе за передпосівного обробітку ґрунту під більшість польових культур. У той же час, за різкого підвищення температури повітря використання знарядь з пружинними робочими органами

включає ризик пересушування ґрунту. Оптимальними за таких умов є знаряддя із стрілчастими робочими органами, зокрема компактори.

Попередники. Із агрономічно-організаційних заходів землеробства серйозне занепокоєння як у нашій області, так і в цілому по Україні, викликає стан роботи з сівозмінами. Необхідно усвідомити, що сівозміна є центральною і незамінною ланкою системи землеробства, її основою.

Вирощування різноманітних культур у правильно побудованій сівозміні забезпечує їм кращі фітосанітарні умови, захищає ґрунт від ерозії, дає змогу збільшити в ньому запас органічної речовини та покращити фізичні властивості.

Розміщення культур після кращих попередників та додержання періодичності повернення їх на попереднє місце вирощування – запорука одержання максимальних урожаїв ярих зернових культур.

Пшениця яра ефективно використовує добрива, які вносили під попередню культуру. Тому її доцільно сіяти після просапних культур – картоплі, кукурудзи, які вирощували на добре удобрених фонах. Кращими попередниками для пшениці ярої є багато- та однорічні бобові трави, бобово-злакові сумішки, зернобобові культури (горох, соя, люпин). Недоцільно вирощувати пшеницю яру після ярих зернових, соняшнику та інших попередників, які сильно висушують ґрунт, наслідком чого є різке зниження врожайності і якості зерна.

Приймаючи до уваги різну морфобіологічну специфіку розвитку кореневої системи і надземної маси рослин вівса і ячменю, необхідно диференційовано підходити до розміщення їх у сівозміні. Рослини ячменю зазвичай утворюють меншу вегетативну масу, ніж овес, тому вони значно слабше пригнічують бур'яни. Кращими попередниками, що забезпечують у посушливих умовах високі врожаї ячменю і вівса, є кукурудза, картопля, зернобобові культури.

Підбір сортів. У сучасних умовах господарювання сорт та високоякісне насіння – це біологічний фундамент, на якому базуються всі інші складові врожайності. Дослідами науково-дослідних установ України встановлено, що до

40% щорічного приросту врожайності зернових культур припадає на долю цих двох чинників. Створення нових поколінь сортів і гібридів дає змогу отримати не тільки високі врожаї сільськогосподарських культур, а й значно поліпшити якість продукції та її конкурентоздатність. Спектр сортів озимих, ярих зернових, зернобобових та круп'яних культур, занесених до Реєстру сортів рослин, що вирощуються в області, досить широкий, тому до вибору сорту слід підходити зважено.

Як свідчить досвід, в основі оцінки і підбору сорту та його впровадження у виробництво повинні знаходитися вимоги високої адаптивності до екологічних особливостей регіону, яка формується, перш за все, у тих сортів, що створені в умовах області. При цьому потенціал реалізації в умовах виробництва відповідної врожайності таких сортів є, як правило, найвищим (вищим за середні багаторічні показники).

Для кращого використання ґрунтово-кліматичного потенціалу в кожному господарстві, яке висіває більше 100 га ранніх ярих зернових культур, потрібно вирощувати 2-3 сорти різних екологічних і біологічних груп, що дає можливість стабілізувати виробництво зерна і знизити навантаження на збиральну техніку у період жнив. Тому товаровиробникам необхідно особливу увагу звертати на сорти, які найбільше адаптовані до ґрунтово-кліматичних умов Чернігівської області, перш за все, місцевої селекції або з екологічно наближених зон.

Пропозиції щодо переліку сортів рослин ярих культур для виробництва в умовах Чернігівщини формуються на підставі даних Українського інституту експертизи сортів рослин (УІЕСР), отриманих при проведенні кваліфікаційної експертизи сортів рослин у філіях в Поліській і Лісостеповій зонах нашої країни.

Сьогодні в Реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні у вказаних зонах знаходиться 105 сортів пшениці ярої, 52 – вівсу посівного, 201 – ячменю ярого, 19 – тритикале ярого тощо. Із вказаної кількості сортів особливу увагу слід звернути на сорти, які за результатами досліджень УІЕСР, а також у

дослідах наукових установ Секції науково-інноваційного розвитку АПК Чернігівської області забезпечували вищу продуктивність, в порівнянні з іншими.

При вирощуванні **пшениці ярої** пропонуються такі випробувані у виробництві сорти вітчизняної селекції як Візерунок, Олександра, Світлана, Оксамит Миронівський, Дубравка, Панянка, Сімкода Миронівська, Ксенія, Магдалена, Райдужна, Рання 93, Краса Полісся. Сорти у випробуванні формували середню урожайність на рівні 4,5-5,5 т/га, максимальну – на рівні 5,4-6,3 т/га. Серед сортів іноземної селекції рекомендуються: Кокса (Польща), Гвадалуп (Франція), Тюбалт, Гренні, Етос, Леннокс, КУІНТУС, КВС Аквілон, Дігана (Німеччина). Середня врожайність сортів була в межах 4,9-5,6 т/га, максимальна – 5,5-6,6 т/га. За якістю сорти відносяться до цінних та сильних, за групою стиглості – до середньоранніх та середньостиглих.

У 2020 р. в Реєстр внесено сорти Дана та Соломія (оригінатор – МПП ім. В.М. Ремесла НААН), які характеризуються високою зерною продуктивністю – 5,0-5,3 т/га (Полісся) та 6,0-6,3 т/га (Лісостеп). Вміст білка становив 13,6-14,0 %, клейковини – 28,5 %, сила борошна – 268-310 о.а., об'ємний вихід хліба – 1020-1160 мл.

Серед новітніх сортів пшениці м'якої ярої, включених в Реєстр: МПП Веснянка, ІС ЯРІЕЛЛА, Танок, Колос Поліський, Перібонка, Сінді, Реліквія, Болтон, Аквітан, КВС Доріум, КВС Карусум, які придатні для поширення в зонах Полісся та Лісостепу України, з середньою прибавкою урожаю 0,3-0,5 т/га. Сорти характеризуються підвищеною стійкістю до посухи, вилягання, осипання зерна, ураження хворобами та пошкодження шкідниками. В умовах Полісся сорти формували середню урожайність в межах 6,0-6,5 т/га.

Серед сортів вітчизняної селекції **ячменю ярого** варто звернути увагу на сорти Селекційно-генетичного інституту НААН: Вакула (середня урожайність 4,34 т/га, прибавка урожаю 0,5 т/га, максимальна урожайність 5,27 т/га), Командор (5,56, +0,14 та 6,14 т/га відповідно), Аватар (4,51, 1,17 та 5,40 т/га), Інституту

рослинництва ім. В.Я.Юр'єва НААН: Етикет (4,6, 0,45 та 5,57 т/га), Модерн (4,96 т/га, 0,19 т/га, 5,05 т/га), Миронівського інституту пшениці ім. В.М. Ремесла НААН: Захисник (5,17, 0,35 та 5,43 т/га), Шарм (4,91, 0,11 та 5,1 т/га), Вдячний (5,26, 0,02 та 6,38 т/га), Вінницької селекційно-дослідної станції НААН: Лофант (4,43, 0,19 та 5,24 т/га), Донецького інституту агропромислового виробництва НААН – Степовик (3,65, 0,54 та 4,4 т/га).

Низку високоврожайних сортів створено в Носівській селекційно-дослідній станції Миронівського інституту пшениці ім. В.М. Ремесла НААН: Варіант, Гося, Імідж, Дар Носівщини, Новатор Носівський, Маріан (середня врожайність за роки випробування становила 3,05-5,61 т/га, максимальна – 6,63 т/га). Серед нових сортів селекції Носівської селекційно-дослідної станції МІП ім. В.М.Ремесла НААН, які включено до Реєстру сортів рослин: Натаір, Носівчанин, Світоч Носівський. Унікальним є створений селекціонерами Носівської селекційно-дослідної станції Миронівського інституту пшениці ім. В.М.Ремесла НААН голозерний сорт ячменю ярого Козацький. Середня урожайність сорту за роки випробування становила 5,19 т/га, максимальна – 5,75 т/га.

Високою продуктивністю характеризуються нові сорти зарубіжної селекції: Стінг, ІС МАЛТИГО, Гінгко, Рут, Тася, Ювента, СБ Скорє, РЖТ ОРБІТЕР, РЖТ АСТЕРОЇД, які формували середню врожайність в межах 3,5 т/га – 6,5 т/га.

Більшість запропонованих сортів придатні для пивоварного виробництва, а також для виробництва цінного зерна.

Добір сортів **вівса** доцільно проводити серед сортів, які створені селекціонерами Носівської селекційно-дослідної станції Миронівського інституту пшениці ім. В.М. Ремесла НААН. Це високопродуктивні сорти Парламентський, Закат (національний стандарт), Візит та перший голозерний сорт вітчизняної селекції Скарб України (національний стандарт). Продуктивність перших знаходиться на рівні 7,0 т/га. Середня врожайність за роки випробування склала 6,2 т/га (Закат) – 6,83 т/га (Парламентський). Голозерний формував урожайність

на рівні 4,0-5,01 т/га. Стабільними за врожайністю є також сорти Тембр, Легінг Носівський, Зубр, Світанок, Візит, Нептун, Зірковий, Деснянський, Райдужний, Чернігівський 28, Чернігівський 27. Серед нових сортів цієї установи: Кузьма Носівський та Матрос.

Серед сортів іноземної селекції слід звернути увагу на Ерлбек, Аргус, Фостер, Вудленд, Ефес та Перун, що формують середню урожайності в зоні Полісся 3,6-5,0 т/га, виявляють ознаки стійкості до вилягання, осипання зерна, посухи, враження сажкою. Маса 1000 зерен – 38-40г.

Серед сортів **тритикале ярого**, кращими є: МПП Хорс, Вікторія, Вуйко, (Носівська селекційно-дослідна станція Миронівського інституту пшениці ім. В.М. Ремесла НААН), Опора харківська, Кріпость харківська, Булат харківський, Достаток харківський, Зліт харківський, Скарб харківський (Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва НААН). Середня врожайність сортів у випробуванні сягала 3,4-3,72 т/га, максимальна 4,69-4,73 т/га.

Підготовка насіння до сівби. Сівбу проводять відкаліброваним насінням, яке за посівними кондиціями відповідає Національним стандартам України. Протруєння насіння є одним із основних і обов'язкових елементів інтегрованого захисту посівів від шкідливих організмів. Для цього застосовують один із препаратів системної дії: Дивіденд стар 036 FS, т.к.с. (1,5-2,0 л/т), Максим стар 025 FS, т.к.с. (1,5-2,0 л/т) та інші, занесені до „Переліку пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні у 2025 році”. Ефективне також оброблення насіння біостимуляторами росту (емістим, триман – 10 мл/т) і мікробними препаратами на основі агрономічно цінних бактерій, але при цьому протруєння насіння слід провести за 10-12 днів до обробки препаратами.

Строки сівби. Ранні ярі зернові культури є найхолодостійкішими культурами, тому їх слід сіяти у ранні строки, як тільки дозволяє стан ґрунту. Критерієм початку сівби є стиглість ґрунту, коли досягається якісне його кришіння при обробітку. Запізнення з сівбою за оптимальних умов зволоження

зумовлює недобір урожаю 0,1-0,5 т/га на кожен день запізнення, а за посушливої весни цей недобір може зростати. Особливо негативно реагують на запізнення з сівбою пшениця яра і ячмінь ярий.

Норми висіву. За узагальненими даними наукових установ оптимальними нормами висіву ячменю ярого в Лісостепу є 4,0-4,5 млн. шт/га; в Поліссі – 4,5-5,0 млн. шт/га; пшениці ярої – відповідно, 5,0-5,5 і 5,5-6,0 млн. шт/га; вівса – відповідно, 4,5-5,0 млн. шт/га та 5,5-6,0 млн. шт/га, тритикале ярого – 5,5-6,0 млн. шт/га.

За умови дотримання всіх вимог агротехніки (якісний передпосівний обробіток, оптимізація мінерального живлення, якісна підготовка насіння, сівба в оптимальні строки) норму висіву ярого ячменю і пшениці можна знижувати до 4,0-4,5 млн. схожих насінин на 1 га. Враховуючи зміну погодних умов, її доцільно корегувати.

Меншу норму використовують за сівби в оптимальні строки на родючіших ґрунтах, після добре удобрених попередників і за достатнього зволоження, а за інших умов її збільшують. Загущення посівів більше 6,0 млн/га за всіх умов недоцільне і не підвищує врожайності. Глибина загортання насіння не повинна перевищувати 3-4 см.

Система удобрення ярих зернових культур. При застосуванні добрив використовуються різні підходи, але їх об'єднує необхідність трьох показників – винесення поживних елементів одиницею урожаю, окупність, яка планується, або прогнозований урожай, біологічні особливості живлення та розвитку культури. Важливо пам'ятати, що продуктивність культури буде визначатися фактором, що знаходиться у мінімумі (опаді, температура, кислотність ґрунту) який важко або неможливо корегувати.

Для отримання врожаю пивоварного ячменю на рівні 5-6 т/га з високими позитивними показниками якості, при посіві або перед ним обов'язково необхідно внести повне мінеральне удобрення в дозі $N_{45}P_{45}K_{45}$. За розміщення ячменю після

картоплі і кукурудзи з урахуванням ступеня удобрення попередника дозу повного удобрення можна збільшити до $N_{50}P_{50}K_{50}$, або зменшити до $N_{30}P_{30}K_{30}$. Слід мати на увазі, що, поряд з азотом, продуктивність ячменю і пивоварні якості зерна можуть лімітуватися рівнем калійного живлення. Вкрай важливо, щоб вміст калію в ґрунті був не менше 80 мг/кг, у протилежному випадку додатково рекомендується вносити калійні добрива у вигляді сірчано-кислих або вуглекислих солей калію (калімагnezія 1,0-1,5 т/га, або Екоплант – 1,0-1,5 т/га). Калімагnezія є джерелом магнію, який необхідний для формування максимальної продуктивності зерна ячменю на ґрунтах дерново-підзолистого типу, за вмісту магнію в орному шарі ґрунту менше 50 мг/га. Екоплант являє собою концентрат попелу соняшника, гречки за вмістом K_2CO_3 – 27-30% в поєднанні з достатньо широким набором мікроелементів. Особливості застосування Екопланту – удобрення має високу окупність зерном за рН орного шару ґрунту у межах 4,5-6,0 одиниць, при рН 7 і більше Екоплант вносити не рекомендується.

Перед посівом ярих культур доцільне внесення азоту в дозі N_{30-45} у вигляді КАСів. Починаючи від фази кущіння до наливу зерна, доцільно вносити азот у вигляді рідких добрив. Захід можна поєднувати із засобами захисту і застосуванням мікроелементів. Концентрація КАСів у робочому розчині не повинна перевищувати 10% (краще 8%), тобто за норми робочого розчину – 250-300 л/га, норма азотних добрив 20 л/га у вигляді КАСів.

На відміну від ячменю, овес має більш розвинену кореневу систему і вищу екскреторну функцію коренів. Це означає, що овес повніше окуповує фосфорні добрива в післядії і менш вимогливий відносно ячменю і пшениці ярої до рівня родючості ґрунту. Овес здатний засвоїти фосфор із фосфоритного борошна і постачати доступний фосфор наступним культурам.

У наших дослідженнях розміщення вівса після кукурудзи на зерно за мінеральної системи удобрення для урожайності зерна вівса 5 т/га і більше достатньо було внести $N_{15}P_{15}K_{15}$ під передпосівну культивуацію та N_{30} по сходах.

При цьому обробка насіння біопрепаратом Поліміксобактерин забезпечувала приріст урожаю 0,5-0,6 т/га півчастого вівса і 0,3- 0,5 т/га – голозерного і була еквівалентна впливу технічного фосфору в кількості P_{30} .

За розміщення вівса після стерньових попередників необхідно вносити азот під передпосівну культивуацію в дозі N_{30} , краще у вигляді КАСів. Слід особливо відмітити, що посів на зернофураж суміші овес (сорт Парламентський, норма висіву – 100 кг/га) плюс ячмінь (сорт Себастьян, норма висіву – 100 кг/га) окуповує добриво дозою $N_{45}P_{20}K_{40}$ 12-19 кг зерна на 1 кг NPK, що в 1,5- 2,0 рази більше відносно оплати добрив зерном пшениці ярої.

Для створення оптимальних умов мінерального живлення ярих культур слід керуватися положеннями про те, що на ґрунтах з підвищеною кислотністю (рН 4,4-4,6) недобір урожаю ячменю і ярої пшениці може складати 20-40%, а вівса – лише 6-10%.

Припосівне внесення добрив. Необхідно особливу увагу приділяти внесенню добрив спільно з посівом. При такому внесенні норма добрив може бути зменшена на 30-40%. Проте за локального внесення добрив слід враховувати сольовий індекс – це сумарна доза азотних, калійних і сірчаних добрив виражена у кг діючої речовини на гектар, яка безпечна для сходів рослин. Так, при висіванні насіння і добрив в одне ложе сольовий індекс складає – 5-10 кг/га, при відстані між насінням і добривами 2,5 см, сольовий індекс дорівнює 12-20, при 5 см – 22-40 кг/га.

За умов посушливої погоди фосфорні добрива під овес та повні мінеральні – під усі ярі культури краще заробити на глибину 6-8 см комбінованим агрегатом, культиватором або дисковими знаряддями, виключаючи локальне (припосівне) внесення добрив за дефіциту вологи. Це дасть змогу збільшити ефективність туків у 1,5-2,0 рази і виключити хімічну посуху.

При боротьбі з бур'янами і хворобами протягом вегетації для досягнення максимальної урожайності 6-7 т/га необхідно в робочий розчин додавати 1,5-

2,0 л/га комплексних хелатних добрив типу «Інтермаг Зернові», «Інтермаг Фосфор» у поєднанні з 10-12 л КАСів при нормі робочої рідини 250 л/га. Таку обробку посівів протягом вегетації бажано провести 2-3 рази.

Захист посівів ранніх ярих зернових від бур'янів, хвороб і шкідників.

Ярі зернові культури забур'янюються, переважно, однорічними дводольними бур'янами: редькою диною, триреберником непахучим, лободою білою, щирицями, гірчаком, підмаренником чіпким, гречкою березкоподібною; злаковими: просом курячим, мишіями; багаторічними: осотом рожевим та березкою польовою; кореневищними – пирієм повзучим.

Строки застосування гербіцидів слід диференціювати залежно від видового складу агрофітоценозу. Якщо домінують однорічні двосім'ядольні бур'яни, посіви обробляють на початку куціння, багаторічні коренепаросткові – у фазі повного куціння.

Вибір гербіцидів залежить від видового складу бур'янів. При забур'яненні посівів ярих зернових культур в основному однорічними двосім'ядольними бур'янами можна застосовувати гербіциди: 2,4Д 500, в.р. (0,9-1,7 л/га), 2М-4Х 750, в.к. (0,9-1,5 л/га), Агрітокс, в.р. (1,0-1,5 л/га) та ін. Обприскування посівів слід проводити у фазі куціння рослин до виходу в трубку.

При розповсюдженні в посівах ярих зернових культур бур'янів, стійких до 2,4Д, пшеницю і ячмінь обробляють гербіцидами Сатіс 18WR, з.п. (0,1-0,15 кг/га), Хармоні 75, в.г. (15-20 г/га + 200 мл/га ПАРТренд 90), Гроділ ультра, в.г. (0,1-0,15 кг/га), Дікам плюс, в.к. (0,8 л/га), Старане 200, к.е. (0,75-1,0 л/га), Діален, в.р. (1,9-2,5 л/га), Гранстар 75, в.г. (20-25 г/га) та іншими рекомендованими препаратами. При розповсюдженні таких злісних бур'янів як багаторічні коренепаросткові (осоти, різні види берізок) можна застосовувати Лонтрел 300, в.р. (0,16-0,66 л/га) або Лонтрім, в.к. (1,5-2,0 л/га). Вибір і доза гербіциду залежить від фази розвитку культури і основних видів бур'янів, ґрунтової відміни, погодних умов, фінансових можливостей господарств тощо.

Захист посівів від сажкових хвороб, кореневих гнилей, плямистостей листя, пліснявіння насіння проводиться за допомогою протруєння насіння тим же способом, що й озимих культур, одним із рекомендованих препаратів: Вітавакс 200ФФ, в.с.к., 2,5-3 л/т; Вінцит 050, к.с. 2,0 л/т; Дивіденд стар 036, т.к.с. 1,0-2,0 л/т; Максим 025, т.к.с. 1,5 л/т та ін.

У період сходи-3-й листок (I-II етапи) проводиться захист посівів від п'явиць (10-30 жуків/м²), смугастих хлібних блішок (30-50 екз./м²), шведських мух (40-50 екз./100 помахів сачком) обприскуванням крайових смуг або всуціль одним із рекомендованих інсектицидів: Актара 25, в.г., 0,1-0,14 кг/га; Бі-58 новий, к.с., 1,5 л/га; Децис профі 25, 0,04 л/т; Карате зеон 050, мк.с. 0,15-0,20 л/га та ін.

У фазі виходу в трубку-цвітіння (IV- IX етапи) проводиться захист посівів від плямистостей листя, борошнистої роси, іржі, септоріозу листя та колоса, фузаріозу колоса за таких умов, як і озимих зернових культур обприскуванням посівів одним із рекомендованих препаратів: Альто супер 330 ЕС, к.е., 0,4-0,5 л/га; Імпакт 25, к.е. 0,5 л/га і ін.

З метою запобігання втратам від злакових попелиць (20-30 екз./колос), хлібних жуків (5-8 екз./м²), злакових трипсів (40-50 екз./колос), шкідливих хлібних клопів (8-10 екз./м².) у період формування зерна (IX-XI етап) проводять обприскування крайових смуг або всуціль одним із рекомендованих інсектицидів: Актара 240 SC, к.с. 0,15 л/га; Дамаск, в.е. 1,5-1,8 л/га; Децис профі 25WG, в.г., 0,04 л/га та ін.

Зернобобові культури

Останніми роками спостерігається суттєве розширення посівних площ під основними зернобобовими культурами в регіоні (соєю, горохом, люпином, викою). Вирощування даних культур у сівозміні поліпшує біологічні процеси в ґрунті через сприятливий хімічний склад корневих та післяжнивних решток, що підвищує ферментативну активність та спроможність наступних культур

сівозміни використовувати малорозчинні поживні речовини. Активна діяльність бульбочкових бактерій у поєднанні з біологічними процесами поліпшує азотний баланс ґрунту, що значно підвищує його родючість. Великого значення в підвищенні родючості ґрунтів набувають зернобобові культури при використанні їх на зелене добриво.

З появою сортів гороху з вусатим морфотипом листка (Комбайновий 1, Модус, Камертон, Дамир 2, Харківський еталонний, Улус, Царевич та ін.) за рахунок підвищеної стійкості їх до вилягання, обсіпання насіння, короткого періоду дозрівання і можливості однофазного збирання з'явилася можливість ефективнішого використання матеріально-технічних ресурсів, зменшення втрат, покращення якості товарної і насіннєвої продукції.

Використання у виробництві вітчизняних кормових сортів люпину вузьколистого (Локомотив, Юліан, Пелікан, Олімп, Переможець, Грозинський 9), що слабо уражуються антракнозом, також сприятиме розширенню посівних площ люпину.

Обробіток ґрунту. Зважаючи на вимоги зернобобових культур до забезпечення вологою, високу потребу у волозі під час проростання насіння, слід приділити особливу увагу передпосівному обробітку ґрунту. Його головною метою повинно стати максимальне накопичення й збереження вологи в ґрунті, а також створення дрібногрудочкової структури посівного шару, що сприятиме якісній, рівномірній сівбі, швидкому проростанню та високій польовій схожості насіння, а також заселенню коренів бульбочковими бактеріями. В умовах поточного року даний агрозахід слід розпочинати в ранні строки, відразу після настання фізичної стиглості ґрунту з розпушування важкими або середніми бородами (БЗТС-1,0), яке проводять під кутом до оранки. Крім раннього боронування, через день-два слід провести передпосівний обробіток на глибину 6-8 см комбінованими агрегатами (АКГ-6, АПБ-6, Компактор, Європак, ЛК-4 та ін.) для поєднання ґрунтообробних операцій. У результаті цього зменшується

кількість обробітків і скорочуються строки виконання робіт, що не допускає пересихання верхнього шару ґрунту, і насіння лягає у вологий ґрунт. Соя надзвичайно вимоглива до якості допосівного обробітку ґрунту, який у різних регіонах зони неоднаковий, повинен бути диференційованим залежно від попередника, рельєфу, забур'яненості поля тощо.

Підбір сортів. Серед сучасних сортів **гороху посівного** (із видозміненою листовою пластинкою) слід звернути увагу на такі сорти вітчизняної селекції Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр'єва НААН як: Меценат та Царевич (урожайність 3,93-4,89 т/га), Оплот (3,08-3,42 т/га), Отаман (3,08-3,48 т/га), Глянс (3,17 т/га), серед зарубіжних: Баритон (урожайність 3,05-4,21 т/га), Астронавт (2,98 – 3,19 т/га) – Німеччина, Профіт (3,08-3,80 т/га, Нідерланди), Терно (3,16-3,45 т/га), Гамбіт (2,68-3,04 т/га) – Чехія.

В останні роки у виробництво все активніше впроваджується **соя**. Вибираючи сорт для вирощування в умовах Лісостепу та Полісся Чернігівщини, необхідно звернути увагу на притаманність йому таких ознак, як: скоростиглість (вегетаційний період сорту, з урахуванням значної залежності даної ознаки від ґрунтово-кліматичних умов вирощування, не повинен перевищувати 100-110 днів); висока стабільна продуктивність (3,0-4,0 т/га) та якість (вміст білка має бути не менше 38%, а жиру – 20-22%); вище середньої адаптивність до лімітуючих факторів довкілля; високу технологічність (компактний габітус рослини з детермінантним типом росту, прикріпленням нижнього бобу не нижче 12 см). Тому раціональним підходом до вибору сорту є:

- наявність у посівах господарства не більше 2-3 сортів, що значно унеможлиблює їх змішуваність (особливо це стосується насіннєвих господарств);
- сорти повинні бути різної групи стиглості та різного сорто типу, що дає можливість провести планове збирання врожаю з урахуванням технічного забезпечення;
- насіння повинно відповідати високим посівним якостям.

Беручи до уваги аналіз результатів екологічної оцінки сортів з урахуванням норми реакції, результатів державного випробування сортів рослин, пропонуємо для впровадження у виробництво в умовах Чернігівщини наступний асортимент сортів:

- скоростиглої групи (СКС): Етюд, Самородок, ЕС КОМАНДОР, Амадеа, Асука, Кобуко, Хуторяночка, Княжна, Меркур, Кінгстон, Анастасія, Аннушка, Аляска, Зельда, Перлина, Мелодія, ОАЦ Аватар, Ранок та інші. Тривалість вегетаційного періоду – до 91 доби, максимальна – 125 діб. Висота рослин – у середньому 80-90 см. Висота прикріплення нижнього бобу – 8-10 см. Притаманна висока стійкість до понижених температур повітря. Рекомендована густота стояння на 1 га – 750-850 тис. шт. Середня врожайність – 2,0-2,5 т/га. Вміст білка – 37-41%, жиру – 19-21%;

- ранньостиглої групи (РС): АФК Фест, Златопільська, Каприз, Санрайз, ФЙОРЕЛЛА, АТРАКТОР, АФК Темпо, ДМ ЕАСТІНА, Кінгстон, Кобуко, РЖТ СІГМА, Сахара ,ФАНТІНЕ, ФРІНЕ, Господиня, Ілюмінатор, Волонтерка, П005А39, Світлиця, СТАЙН 04Н32 ,ЕХТС 411, ДМ ДІНІПРА, та інші. Тривалість вегетаційного періоду – 91-105 діб. Переважно детермінантний тип росту. Висота рослин – у середньому 90-100 см. Висота прикріплення нижнього бобу – 8-12 см. Рекомендована густота стояння на 1 га – 650-750 тис. шт. Середня врожайність – 2,2-2,7 т/га. Вміст білка – 38-42%, жиру – 19-22%.

У зоні Лісостепу сортимент сортів можна доповнити сортами середньостиглої групи, такими як Королева, Камерон, Матільда, Крістіан, КРЕОЛА, Сафіра, Рівертон, Смарагд, Дакота, СТІНЕ 11Н20, Мерлін та середньоранньої – Версія, Васильківська, Медісон, Золотиста, Фарватер, Таврія, Даная, Смуглянка.

Серед сортів **вики ярої** заслуговують на увагу нові: Нітро, Бурштин, Аргон, Ворскла, Неон, Оазис, Пірит, Віннер, Діоніс та ті що себе добре зарекомендували: Білоцерківська 96, Надія Поділля, Єлізавета, Озіряна, Наталка, **люпину жовтого:**

Дарунок Полісся, Золотий купол, Прогресивний, Ярило, Чернігівець, **люпину білого**: Рапсодія, Щедрий 50, Серпневий, Снігур, Барвінок, Макарівський, **люпину вузьколистого**: Локомотив, Юліан, Ілдіго, Віктан, Віват, Переможець, Грозинський 9.

Сівбу зернобобових культур (крім сої) необхідно проводити в максимально ранні та стислі строки при настанні фізичної стиглості ґрунту (***прогнозовано кінець III-ї декади березня - II декада квітня***). Це сприятиме раціональному використанню вологи, а також появі рівномірних, дружних сходів.

Сою починають сіяти за температури ґрунту 10-12°C (орієнтовно третя декада квітня – перша декада травня). При ранній сівбі в непрогрітий ґрунт насіння уражується хворобами. Сівба в оптимальні строки та загортання насіння на глибину 3-4 см прискорює його проростання і, відповідно, знижує ураження сходів бактеріальними хворобами та пошкодження ґрунтовими шкідниками.

Задовільної густоти рослин у посівах зернобобових культур можна досягти за оптимальних норм висіву насіння: гороху – 1,2-1,4 (“вусаті” сорти) та 1,5 (листочкові сорти); люпину жовтого і вузьколистого – 1,1-1,2; люпину білого – 0,9-1,0; вики ярої – 2,0-2,5 млн. схожих насінин на 1 га звичайним рядковим способом. Глибина заробки насіння повинна бути мінімальною і становити 2-4 см (до 5 см на супіщаних ґрунтах). Для захисту рослин люпину жовтого і білого видів від антракнозу та збільшення коефіцієнту розмноження насіння, його висівають широкорядним (45 см) способом з нормою 0,6-0,8 млн. шт./га. Посів сої також проводять широкорядним способом з міжряддям 45 см. Норма висіву 500-600 тис. шт./га схожих насінин. На чистих від бур'янів полях можна висівати рядковим способом з міжряддям 15 см, при цьому норму висіву збільшують до 700 тис. шт./га. Вагова норма висіву становить у середньому 80-100 кг/га.

У залежності від погодних умов протягом вегетації та агротехніки вирощування, інтенсивність зараження насіння шкідливими збудниками хвороб за роками може суттєво різнитися, але інфекція буде присутня на посівному матеріалі

в будь-якому випадку. Як показує практика останніх років, при вирощуванні зернобобових культур, і особливо, люпину, значну увагу слід приділяти системі запобіжних заходів боротьби з бактеріальними та грибними хворобами рослин. Гарні результати при обробці насіння люпину (всіх культивованих видів), гороху, а також вики ярої забезпечують пестициди: Фундазол 50% з.п. (3 кг/т), Дерозал, 50 % з.п. (2,5 кг/т), Максим XL (1 л/т), Раксил, 51,1 % т.к.с. (2 л/т), Вінцит 5% к.с. (2 л/т), Вітавакс 200ФФ 34% (2 л/т). Посіви люпину потребуватимуть додаткових обробок рослин фунгіцидами і в період вегетації (особливо від антракнозу) у фазі початку бутонізації (Бавистін ДФ 500 г/кг (0,75 кг/га), Фолікур БТ, 22,5 % к.е. (1 л/га), Імпакт 25% (0,5 л/га), Прозоро, к.е. (0,6-0,8 л/га), Солігор (0,7-0,9 л/га). За сприятливих для збудника хвороби погодних умов, через 10-12 днів проводять повторне обприскування посівів. У фазі бутонізації, на посівах люпину вузьколистого, слід провести захист від шкідників інсектицидами БІ 58 новий, 400 г/л к.е.(0,5-1,0 л/га), Децис, к.е. (0,2 л/га) та тощо.

Кукурудза

Технологія вирощування кукурудзи в умовах Лівобережного Полісся відрізняється від рекомендованої для інших зон України, оскільки при задовільній вологозабезпеченості лімітуючим фактором є температурний режим. Усі прийоми технології вирощування кукурудзи спрямовані на продовження строків вегетації рослин, підвищення теплопровідності, покращення температурного режиму і капілярного зволоження верхнього шару ґрунту в ранньовесняний період та максимальну конкурентоздатність кукурудзи бур'янам.

Для цього необхідно як можна раніше провести ранньовесняне боронування з метою зменшення капілярного випаровування вологи і створення умов для проростання бур'янів. Після появи сходів бур'янів проводять першу культивуацію на глибину 10-12 см. Другу хвилю пророслих бур'янів знищують передпосівним

обробітком, який найкраще провести за допомогою комбінованих агрегатів типу Компактор, Європак, КОМБІ-8, РВК-3,6 і ін.

Передпосівний обробіток проводять на глибину загортання насіння: на 4-6 см на важких ґрунтах і на 6-8 см на легких ґрунтах. Перед сівбою або зразу після неї вносять ґрунтові гербіциди (Примекстра, Харнес), які добре працюють в умовах достатнього зволоження, тому необхідно більш орієнтуватись на їх застосування цієї весни.

Температурний режим вегетації кукурудзи за прогнозом буде близьким до середньобагаторічного показника, тому гібриди кукурудзи на зерно необхідно брати: для північних районів – ранньостиглої групи (ФАО 180-220), для південних – 70% ранньостиглі і 30% середньоранньої групи (з ФАО не більш 260). Такі гібриди забезпечать повну стиглість зерна кукурудзи до 20-25 вересня і значно знизять затрати на післязбиральне досушування зерна.

Підбір гібридів Із значної кількості сортів кукурудзи, які внесені до Реєстру, слід звернути увагу на найбільш продуктивні, рекомендовані для зон Лісостепу і Полісся: ранньостиглі вітчизняної селекції ДН Пульсація, П7515, ДН Синевир, КМ 2161, ГУ9003, Заліщицький 191 СВ, АРІОН, РАМ 1033, Ферум, Дніпровський 181 СВ, ДБ Лада. Середня урожайність сортів у зоні Лісостепу сягає 8,0 т/га, в зоні Полісся – 7,0 т/га; середньоранні (понад 40 сортів): Дулконо, Кардіф, СИ ФРЕГАТ, МОНСТР, ЕС КАТМАНДУ, БЕЛАМ, КМ 3310, КМ 3260, ЗП 299, АГРОПОЛІС, ДКС 3969, ДКС 3566, АС 35004, КАЛУПАС, Талентро, П 7925 та інші. Прибавка урожаю (за середньої урожайності вище 8,0 т/га в Лісостепу та 7,5 т/га на Поліссі) в названих сортів коливалася в межах 1,0-2,0 т/га.

Кукурудза потребує посиленого мінерального живлення, що обумовлюється довгим періодом вегетації та здатністю рослин засвоювати поживні речовини аж до визрівання врожаю.

На кожен тону зерна кукурудза виносить з ґрунту 25 кг азоту, 12 кг фосфору, 30 кг калію. Тому удобрення кукурудзи необхідно проводити з урахуванням вмісту

поживних речовин у ґрунті, попередника, застосування органічних добрив тощо. Для одержання врожайності на рівні 8-10 т/га необхідно вносити 120-150 кг азоту, 90-100 кг фосфору і 120-150 кг калію.

В останні роки в області відмічається збільшення в посівах кукурудзи ушкоджень від кукурудзяного метелика. Він знижує якість продукції і погіршує умови збирання (зламані стебла). Для боротьби з ним необхідно в період льоту кукурудзяного метелика (10 днів до викидання волоті) посіви обробляти перитроїдами (Карате, Децис), або специфічними препаратами (Каратель). На невеликих площах ставляться феромонні пастки з розрахунку 1 пастка на 4 га.

Ріпак ярий

У сучасних умовах, при постійному зростанні цін на пальне ріпак, набуває великого значення, в першу чергу, як джерело біологічного палива. Ярий ріпак є ранньою яровою культурою. Його вирощування доцільне на ґрунтах середньо- і добре окультурених.

Кращі попередники ярого ріпаку: озима пшениця, озиме жито, на незабур'яненних полях – кукурудза і ярі зернові.

Передпосівний обробіток повинен забезпечити рівномірне загортання насіння і створення оптимального посівного шару ґрунту. Проводять його під ріпак культиваторами КПС-4 із плоскорізними лапами, що дозволяє забезпечити добре загортання гербіцидів й утворити ущільнене ложе для насіння. В останні роки широко застосовують агрегати типу «Європак», АП-3,7, АП-6 та ін.

Для знищення однорічних бур'янів рекомендовано використання вискоєфективного гербіциду Трефлан 48% к.е. і його аналогів (трифлурекс) з нормою 1,2-1,5 кг/га д.р. (2,5-3,0 л препарату +250-300 л води) під передпосівну культивацію з негайним загортанням його в ґрунт. Знищення багаторічних дводольних коренепаросткових бур'янів у період вегетації ріпаку проводять

препаратами Лонтрел 300, 30% в.р., Лонтрел гранд, 75% в.р. з нормою 0,12-0,15 кг/га у фазу розвиненої розетки в осоту.

Підбір сортів. У ріпаку ярого для зон Полісся та Лісостепу рекомендовано 17 сортів: Кларо КЛ, Лагун, Клауд КЛ, Колет КЛ, Лавіна, Лакріц, Перформер, САОКЕР КЛ, Чеві КЛ, ІНВ110 КЛ, Караміно КЛ, ЦЕБРА КЛ, Клеопатра, ЛАНЦІЯ, ЛАГОНДА, 71 20 КЛ, Мірко КЛ, які забезпечують середню урожайність 2,2-2,6 т/га). Вміст олії в насінні – 45-46%, білка – біля 24%.

Сівба. Ярий ріпак висівають відразу ж у міру підготовки ґрунту одночасно з ранніми зерновими. Своєчасні і дружні сходи забезпечуються при неглибокому загортанні насіння (1,5-2,0 см) у вологий, прогрітий ґрунт. При пересиханні верхнього шару ґрунту глибину загортання насіння збільшують до 3-4 см, а норму висіву на 5-10%. Оптимальна норма висіву ярого ріпаку – 1,5-2,0 млн. шт. схожого насіння на 1 га. Після сівби поле коткують важкими кільчато-шпоровими котками.

Догляд за посівами розпочинається з досходового боронування, яке проводять через 2-5 днів після сівби.

У період вегетації для боротьби зі шкідниками сходи ріпаку обприскують препаратами Фастак, Децис-Форте, Ф'юрі, або аналогами, зареєстрованими для даної культури з нормою 0,1 л/га.

При оптимальних ранніх строках сівби, якісному передпосівному обробітку, раціональній нормі висіву необхідності в боротьбі з бур'янами в посівах ріпаку немає.

Гречка

Гречка – вологолюбна культура і в посушливі роки формує низькі врожаї, особливо негативно діють на культуру високі температури.

Розміщення в сівозміні. Гречку краще сіяти після озимої пшениці, ячменю, кукурудзи, зернобобових та пересіву озимини. Вона є добрим попередником для інших культур у сівозміні.

Гречка добре засвоює фосфор і калій з важкорозчинних сполук і переносить їх з нижніх горизонтів ґрунту у верхні.

Обробіток ґрунту під круп'яні культури після стерньових попередників включає два луцення стерні, потім оранку або плоскорізний обробіток на глибину 25-27 см. Після кукурудзи можна виконати одне луцення й оранку на 25-27 см.

Весняний обробіток ґрунту під гречку по зябу та після загиблої озимини повинен забезпечити найбільше знищення бур'янів і зберегти оптимальну вологість ґрунту. Це досягається проведенням двох культивацій на 10-12 і 6-8 см.

Добрива. Добрива можна вносити під основний обробіток ґрунту восени або під культивацію навесні локальним способом. Ефективно під час сівби в рядки внести P_{10} (або складні добрива).

Пізнє позакореневе підживлення гречки сечовиною (10 кг/га д.р.) або мікродобривами збільшує вміст у зерні білків. Калійні добрива, в яких міститься хлор, негативно впливають на продуктивність гречки і пригнічують рослини.

Сівба. Сіяти гречку потрібно після стійкого прогрівання ґрунту до 10-12°C. При сівбі за цих умов сходи її з'являються на 6-8 добу, а цвісти рослини починають наприкінці травня або на початку червня на 30-33-у добу вегетації. При пізніших строках сівби гречка зацвітає у жарку посушливу пору літа, що зумовлює запали посівів і значне зниження врожайності.

Оптимальна глибина сівби насіння – 4-5 см, але у сухий ґрунт його можна заробити на 6-8 см.

Урожайність кращих нових сортів у гречки, які рекомендуються для виробництва, становить 2,5-3,7 т/га (Амазонка, Володар, Кам'янчанка, Медова, Подільська, Покровська, Рута, Дея, Єлена, Калинівна, Ольга, Петропавлівська, Сімка, Христина, Ювілейна 100). Серед нових сортів – сорти ННЦ «Інститут землеробства НААН»: Покровська (урожайність 3,51-4,05 т/га), Калинівна (3,48-4,01 т/га), Ольга (3,30-3,70 т/га), Рута (2,85 т/га), Мальва (2,92-3,44 т/га).

Догляд за посівами включає післяпосівне коткування ґрунту, боронування до появи сходів і у фазі утворення 1-2 справжніх листків у гречки. При боронуванні середніми боронами у фазі 1-2 справжніх листків посіви гречки зріджуються на 15-20%. На широкорядних посівах при появі бур'янів, утворенні ґрунтової кірки необхідно провести міжрядні обробітки, а також підгортання рослин у рядках.

Просо

Попередники. Культуру слід розміщувати після озимих зернових культур: кукурудзи, пересіву озимих, під які внесено достатню кількість добрив. Цінними попередниками для нього є зернобобові культури і багаторічні трави.

Обробіток ґрунту. Після зернових, зернобобових культур під просо обробіток починають із лущення стерні на глибину 6-8 см, що сприяє збереженню вологи. Поля, засмічені багаторічними бур'янами, дискують важкими боронами на глибину 6-8 см, вдруге, через 10-15 діб – на 10-12 см. Зяблеву оранку проводять на глибину 20-22 см.

Якщо просо розміщують після багаторічних трав, слідом за збиранням поле дискують з метою подрібнення післяжнивних решток і їхнього кращого приорювання.

Весняний обробіток ґрунту має забезпечити очищення його від бур'янів, зберігання вологи й створення пухкого посівного шару ґрунту. З цією метою поле боронують боронами БЗТС-1, а по плоскорізнму зябу – БИГ-3А, БМШ-3А, у два сліди впоперек або по діагоналі поля до напрямку оранки. Після загиблої озимини слід проводити дві культивації – на 8-10 і 5-7 см.

Удобрення. Добрива в дозі $N_{60}P_{60}K_{40}$ краще вносити під зяблеву оранку, навесні під першу культивацію або перед сівбою. Якщо основного внесення мінеральних добрив не проводили, доцільно внести їх під час сівби в рядки з розрахунку 10-15 кг/га д.р.

Сівба. Проти збудників хвороб насіння протруюють Фундазолом, 50% з.п. – 2,0 кг/т, Вітаваксом, 75% з.п. – 2,0 кг/т, Фенорамом – 2 кг/т з додаванням плівкоутворюючих речовин.

Просо можна висівати суцільним рядковим способом, який проводять зерновими сівалками різних типів з нормою висіву 3,5-4,0 млн./га.

Просо слід висівати в оптимальні строки, коли ґрунт на глибині 10 см прогріється до 12-15°C. Насіння загортають на глибину 3-5 см, а якщо вологи недостатньо, загортання збільшують до 5-7 см.

Внесені до Реєстру сорти **проса** здатні формувати врожайність понад 5,0 т/га. Серед нових, що рекомендовані для зони Полісся та Лісостепу: Переможне, Кеша, Ярдуш, Дивовижне, Казкове джерело, Корнбергер Міттelfрюе, Живинка, Альтернативне, Особливе – середня врожайність у сортовипробуванні складала 5,11 т/га, максимальна – 5,75 т/га. Для післяукісних та післяжнивних посівів створено ранньостиглий сорт Золушка (відповідні показники 3,51 та 4,13 т/га).

Догляд за посівами. Важливим заходом догляду за посівами є коткування ґрунту слідом за сівбою. При цьому поліпшується контакт насіння з ґрунтом, збільшується вологість його верхнього шару та підвищується температура. Усе це сприяє дружному проростанню насіння і прискорює появу сходів.

Гербіциди на посівах проса застосовують при забур'яненості однорічними широколистими бур'янами (гірчиця, редька дика, свиріпа, щириця, осоти та ін.). Для цього застосовують гербіциди: Агрітокс (1,0-1,5 л/га), Базагран (2-4 л/га), 2,4-Д (0,2-1,7 л/га). Просо найменш чутливе до дії гербіцидів у період від появи сходів до закінчення кушення.

Для знищення злакових бур'янів (мишію, курячого проса, вівсюга та ін.) застосовують гербіцид Пропазан (3,6 кг/га).

Хімічне прополювання проса можна поєднувати з позакореневим підживленням фізіологічно активними речовинами та азотними добривами,

додаючи до гербіцидів аміачну селітру з розрахунку 10-15 кг/га. Це значно поліпшує також дію гербіцидів.

Картопля

Особливість агротехніки картоплі у 2025 році полягає в тому, щоб якомога продуктивніше використати вологу. Насамперед, на площах, де посіяне озиме жито на зелений корм, не допустити його переростання, оскільки воно в значній мірі сприяє висушуванню ґрунту.

У сухому ґрунті уповільнюється мінералізація органічних добрив. Тому, для прискорення мінералізації соломистого гною, небобових сидератів і соломи необхідно внести азотні добрива із розрахунку 10 кг діючої речовини азоту на одну тону соломи.

Як гній, так і мінеральні добрива краще вносити під оранку. Це сприяє росту кореневої системи не горизонтально, а вглибину, де вони зможуть знайти не тільки поживу, а й воду.

Пересиханню ґрунту, також сприяє нарізання високих гребенів. Тому міжрядні обробітки повинні бути спрямовані на їх вирівнювання.

Серед нових сортів картоплі слід звернути увагу на такі:

- ранньостиглі: Ред Скарлет (середня урожайність у випробуванні на Поліссі 31,3 т/га, крохмаль – 11-13 %, столовий), Дербі (31,3 т/га, 13 %, столовий, Голандія), Амороза (27,9 т/га, 13%, столовий, ТОВ "Агріко Україна"), Лабадія (28,4 т/га, 14 %, столовий, Німеччина), Щедрик (33,0 т/га, 16%, столовий, Інститут картоплярства НААН);

- середньоранні: Сильвана (28,1 т/га, 12-14 %, столовий), Моцарт (26,9 т/га, 14-16 %, столовий), Коломба (27,1 т/га, 13%, столовий) – Голандія; Роксана (26,3 т/га, 12-14 %, столово-технічний), Рамос (28,8 т/га, 16%, столовий) – Німеччина; Плюшка (19,3 т/га, 20%, для переробки) – Сумський НАУ; Аладін

(30,4 т/га, 16 %, ТОВ "Агріко Україна"); Арія (28,4 т/га, 14 %, столовий, Інститут картоплярства НААН).

- середньостиглі: Сильвана (28,1 т/га, 12-14 %, столовий), Сіфра (26,2 т/га, 14-18 %, столовий), Арізона (27,5 т/га, 13 %, столовий) – Голандія; Джеллі (26,9 т/га, 15-18 %, столовий), Інара (30,5 т/га, 15 %, столовий), Аллора (29,0 т/га, 15 %, столовий) – Німеччина; Чарунка (26,8 т/га, 17 %, столовий), Околиця (28,1 т/га, 16 %, столовий та для переробки, Інститут картоплярства НААН).

Досить важливо в умовах нестачі вологи застосовувати стійкі до засухи сорти. Найбільш придатним для цього є сорт Тирас, який в умовах засухи забезпечує найвищі врожаї. Ця особливість забезпечила йому найбільше поширення на півдні України на площах без поливу.

Досить добре використовують зимово-весняні запаси вологи ранньостиглі вітчизняні сорти картоплі Серпанок, Скарбниця, Вимір, Ведруска, із зарубіжних – Невська, Беллароза, Рів'єра, Рокко.

Підвищений вміст крохмалю мають сорти Арія (23 %, 2014 р., ІК), Констанс (25-32 %, 2017 р., Нідерланди), Бельмонда (28-33 %, 2016 р., Німеччина).

Серед новітніх сортів в Реєстрі: САНІБЕЛЬ, Медісон, Орла, РІКАРДА, ДОНАТА. Рекомендуємо звернути увагу на сорти САНІБЕЛЬ та РІКАРДА. САНІБЕЛЬ – надранній сорт, здатний формувати через 65 днів після садіння та в наступні з інтервалом 10 діб урожай, відповідно, 15,2, 17,8 та 22,3 т/га. Максимальний урожай в зоні Полісся Чернігівщини (Чернігівський ОДЦЕСР) – 25,1 т/га, вміст крохмалю – 14,1 %, дегустаційна оцінка – 6,6 балів. Колір шкірки – червоний, м'якуша – жовтий, лежкість та товарність високі. РІКАРДА належить до групи середньостиглих сортів, середній урожай 22,1 т/га, максимальний – 24,9 т/га. В порівнянні з групою середньостиглих сортів, до якої відносяться також Орла та Доната, прибавка врожаю становить в середньому 2,5 т/га. Вміст крохмалю – 14,8 %, дегустаційна оцінка – 6,2 бала. Колір шкірки червоний, м'якуша – білий, лежкість та товарність високі. Сорт ДОНАТА, за вмісту

крохмалю 18,0 %, формує урожайність меншу, ніж РІКАРДА (середня – 19,8 т/га), але збір крохмалю з 1 га на 0,35 т/га більший – 4,37 т/га.

Захист посадок картоплі від бур'янів повинен плануватися з урахуванням засміченості поля, відведеного під картоплю, конкретними їх видами. Для знищення дводольних і однорічних злакових бур'янів досить ефективним є Зенкор і його аналог Антисапа а також і Примекстра за 5-7 днів до появи сходів картоплі. Зенкор можна застосовувати як одноразово в дозі 0,8 -1,0 кг/га, так і в два прийоми. Перший – у дозі 0,6 кг/га до появи сходів, другий – при висоті сходів картоплі 5-8 см. Примекстру можна застосовувати тільки до появи сходів. Залежно від виду Примекстри дозу цього препарату необхідно корегувати так, щоб доза атразину, який міститься в ній, не перевищувала 1 кг/га.

Захист від хвороб необхідно починати з обробки бульб проти основних хвороб (фітофтори, альтернаріозу і ризоктоніозу) наступними протруйниками: Селест топ, або сумішшю Максим 025 + Круїзер. У період вегетації картоплю доцільно обробляти такими препаратами, як Захист, Ридоміл голд, Ширлан, Ревус.

Від колорадського жука ефективною є обробка бульб Матадором або Конфідором в суміші з протруйниками. По вегетуючих рослинах в даний час найвищу ефективність проявляють Каліпсо та Енжіо.

ЗАСТОСУВАННЯ МІКРОБНИХ ПРЕПАРАТІВ У ТЕХНОЛОГІЯХ ВИРОЩУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР

Сьогодні створено мікробні препарати для більшості видів сільськогосподарських культур та визначено умови їх ефективного застосування. Біопрепарати мають комплексний позитивний вплив на ріст і розвиток рослин та стан агроценозів.

Для передпосівної інокуляції насіння низки зернобобових культур (сої, гороху, квасолі, люпину та нуту) рекомендовано мікробний препарат **Ризогумін** (ТУ У 24.1-00497360-003:2007) на основі азотфіксувальних бульбочкових бактерій. Застосування препарату в технологіях вирощування культур забезпечує формування активного бобово-ризобіального симбіозу, зростання інтенсивності засвоєння азоту з атмосфери, інтенсифікацію процесів азотного обміну в рослинному організмі і, як наслідок, збільшення врожайності та вмісту білка в продукції. Препарат випускається у двох препаративних формах – порошкоподібний та рідкий. Для сої пропонується порошкоподібний Ризогумін на основі бінарної композиції штамів. Для інших зернобобових культур та багаторічних трав рекомендовано мікробний препарат **Ризобофіт** (ТУ У 319.00494456-006-2002) також на основі азотфіксувальних бульбочкових бактерій.

Для небобових культур рекомендовано низку мікробних препаратів на основі асоціативних азотфіксувальних бактерій. Це, зокрема, **Діазобактерин** (ТУ У 24.1-00497360-002:2005) – для покращення азотного живлення та збільшення врожайності озимого жита, гречки, пажитниці однорічної.

Препарати на основі фосфатмобілізівних мікроорганізмів представлені наступними: **Поліміксобактерин** для кукурудзи, соняшнику й пшениці (обробка насіння та фоліарно) та **Альбобактерин** (ТУ У 24.1-00497360-005:2009) для ріпаку та гірчиці. Важливим аспектом механізму позитивної дії даних

мікробних препаратів є вплив бактерій на доступність важкорозчинних фосфатів ґрунту. Крім того, мікробні метаболіти активно розчиняють мінералофосфати ґрунтів, переводячи їх із запасного пулу в метаболічний. Дієвим інгредієнтом інтродукованих мікроорганізмів є біологічно активні сполуки, які забезпечують рістстимулювальний ефект для рослин. При цьому відмічається інтенсивний розвиток кореневої системи та зростання її абсорбуючої здатності, що також позначається на засвоєнні фосфору сільськогосподарськими культурами.

Ефективним мікробним препаратом широкого спектру дії на продукційний процес сільськогосподарських культур є *Хетомік* (ТУ У 20.1-00497360-008:2013). Біоагент Хетоміку – ґрунтовий сапрофітний мікроскопічний гриб *Chaetomium cochliodes*, здатний активно колонізувати кореневу систему багатьох сільськогосподарських культур і виявляти високу антагоністичну активність проти збудників таких хвороб як кореневі гнилі зернових і зернобобових культур; сіра та біла гнилі гороху, сої, соняшнику, овочевих культур; фузаріоз і фузаріозне в'янення гороху, сої, люпину, льону, овочевих культур; фузаріозна гниль і коренеїд цукрових буряків; звичайна і срібляста парша картоплі; ризоктоніоз картоплі та овочевих культур.

В Інституті сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН створено також й інші мікробні препарати комплексної дії – на основі азотфіксувальних бактерій та біологічно активних сполук природного походження (фітогормони, амінокислоти, вітаміни та ін.). Це *Мікрогумін* (ТУ У 24.1-00497360-007:2009) для ячменю ярого та вівса, та *Біогран* (ТУ У 24.1-00497360-006:2009) для картоплі, капусти, огірків і томатів.

Наведені біопрепарати, як і Ризогумін, є комплексної дії, крім бактеріального компоненту, містять у своєму складі фізіологічно активні речовини біологічного походження, зокрема, фітогормони. За сприятливих умов компоненти біопрепаратів діють на рослину синергічно; за несприятливих, коли дія бактеріального компоненту може бути послабленою, на продукційний процес

культури впливає фізіологічно активний компонент. При цьому гарантується зростання врожайності вже за рахунок інших механізмів, але головна мета – зростання продуктивності агроценозу – досягається.

Для боротьби з дрібними мишоподібними гризунами на посівах сільськогосподарських культур, пасовищах, у садах, а також у різних господарських спорудах ефективним є зерновий бактеріальний родентицид *Антимицин* (ВВ-00866-02-18). Препарат зручний у використанні, добре поїдається гризунами, викликає їх захворювання і загибель через 5-14 діб у 95-100% випадків. Особливо великою цінністю препарату є його здатність викликати епізоотію серед популяції гризунів.